

令和8年10月9日

令和8年度病害虫発生予察情報 第7号（10月予報）

群馬県農業技術センター
 土壌・病害虫部 発生予察係
 （病害虫防除所）
 TEL 0270-62-1059
 FAX 0270-20-8016

【予報の概要】

作物名	病害虫名	対象地域名	発生時期	発生量
果樹全般	カメムシ類 (チャバネアオカメムシ)	栽培地帯全域	—	並
	ハダニ類	栽培地帯全域	—	並
りんご	斑点落葉病	栽培地帯全域	—	並
	炭疽病	栽培地帯全域	—	並
	スモモヒメシクイ	栽培地帯全域	—	並
	キンモンホソガ	栽培地帯全域	—	並
	ハマキムシ類	栽培地帯全域	—	並
野菜類 花き類	アブラムシ類	栽培地帯全域	—	並
	ハスモンヨトウ	平坦地域	—	並
	オオタバコガ	栽培地帯全域	—	並
施設果菜類	コナジラミ類	施設栽培地帯全域	—	並
キュウリ	べと病	施設栽培地帯全域	—	並
	うどんこ病	施設栽培地帯全域	—	並
	褐斑病	施設栽培地帯全域	—	並
	アザミウマ類	施設栽培地帯全域	—	並
ネギ	軟腐病	栽培地帯全域	—	並
	さび病	栽培地帯全域	—	並
	シロイチモジヨトウ	栽培地帯全域	—	やや多い
	ネギアザミウマ	栽培地帯全域	—	並

（発生時期の—は連続発生）

【主な病害虫の発生予報】

I) 果樹類全般

果 樹 カ メ ム シ 類 (チャバネアオカメムシ)	発 生 地 域	発 生 時 期	発 生 量
	栽 培 地 帯 全 域	—	並

1 予報の根拠

- (1) 現在までの発生量および果実への被害は平年並である。
- (2) 県内に設置したフェロモントラップのうち、平年との比較が可能な6地点では、9月の総誘殺数は平年並～多かったものの、誘殺数はその後減少傾向を示した。その結果、高崎市箕郷町を除く5地点における9月下旬の誘殺数は概ね平年並である。
- (3) 高崎市箕郷町においても、誘殺数は9月中旬をピークに減少傾向にある。
- (4) 向こう1か月の気象予報(10月8日発表)によると、平均気温は高い確率70%である。

《発生しやすい条件：越冬量が多い年は、果樹園への飛来が多くなる可能性が高い。》

2 防除上注意すべき事項

- (1) 果樹カメムシ類の飛来状況は園地によって異なるため、園内をこまめに見回り、早期発見に努め、飛来を認めたら速やかに防除を行う。特に、夜間の最低気温が高くなると飛来する可能性が高くなるので注意する。
- (2) 果樹カメムシ類は夜行性であるため、活動の鈍い早朝に薬剤散布を行うと効果的である。
- (3) 9月下旬以降、気温が高めに推移したため、10月1半旬には誘殺数が増加した地点も認められる。引き続き、農業技術センターが提供するフェロモントラップ調査結果を参考に、園内における飛来状況を確認し、適切な防除に努める。

II) 野菜類・花き類

オ オ タ バ コ ガ	発 生 地 域	発 生 時 期	発 生 量
	栽 培 地 帯 全 域	—	並

1 予報の根拠

- (1) 現在までの発生量は平年並である。
- (2) 県内のフェロモントラップ調査の誘殺数は、7地点中3地点で平年並、4地点で平年に比べて少ない。
- (3) 向こう1か月の気象予報(10月8日発表)によると、平均気温は高い確率70%、降水量は少ない確率40%、日照時間は平年並または多い確率ともに40%である。

《発生しやすい条件：高温、乾燥条件で多発する傾向がある。》

2 防除上注意すべき事項

- (1) 今後、発生しやすい気象が予報されているため、農業技術センターが提供するフェロモントラップ調査結果を参考に、ほ場における発生状況を確認し、適切な防除を行う。特に、誘殺数が平年並の前橋市、藤岡市、太田市では引き続き注意が必要である。
- (2) 幼虫は生長点付近の茎葉・蕾・花・幼果に食入する。組織内に入り込まれてからでは防除が困難になるため、ほ場をよく見回り、幼虫は見つけしだい捕殺する。薬剤防除を行う場合は、発生初期に実施する。
- (3) 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布を避ける。
- (4) 施設開口部は防虫ネット等(目合い4.0mm以下)で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。

Ⅲ) ネギ

シロイチモジヨトウ	発 生 地 域	発 生 時 期	発 生 量
	栽 培 地 帯 全 域	—	やや多い

1 予報の根拠

- (1) 現在までの発生量は平年並である。
- (2) 県内のフェロモントラップ調査の誘殺数は、2地点ともに平年並である。
- (3) 向こう1か月の気象予報(10月8日発表)によると、平均気温は高い確率70%、降水量は少ない確率40%、日照時間は平年並または多い確率ともに40%である。

《発生しやすい条件：気温が高いと世代期間が短縮し発生回数が多くなり、被害が多くなる。》

2 防除上注意すべき事項

- (1) 中老齢幼虫では薬剤感受性が低下し、葉の内部に潜り込むと防除効果が低下する。そのため、ほ場をよく観察して早期発見に努め、薬剤による防除を若齢期に行う。
- (2) 卵塊や若齢幼虫の集団を見つけた場合は、速やかに取り除き、ほ場外で適切に処分することも効果的な防除方法である。
- (3) 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布を避ける。
- (4) 雑草にも寄生するので、ほ場周辺の雑草を除去する。
- (5) 今後、発生量が増加しやすい気象が続くと予報されているため、県が発表するトラップ調査結果や情報を確認し、ほ場での発生に注意する。

Ⅳ) 施設果菜類

コ ナ ジ ラ ミ 類	発 生 地 域	発 生 時 期	発 生 量
	施設栽培地帯全域	—	並

1 予報の根拠

- (1) 現在までの発生量は平年並である。
- (2) 向こう1か月の気象予報(10月8日発表)によると、平均気温は高い確率70%である。

《発生しやすい条件：生育適温20～30℃で、乾燥条件の場合。》

2 防除上注意すべき事項

- (1) タバココナジラミは、キュウリ退緑黄化病やトマト黄化葉巻病の原因となるため防除に気をつける。発病株を発見した場合は直ちに抜き取り、施設外へ持ち出して適切に処分する。
- (2) 施設の開口部は全て防虫ネット(目合い0.4mm以下が望ましい)を設置して、施設内への侵入を防止する。
- (3) 雑草にも寄生するので、ほ場周辺の雑草を除去する。
- (4) 黄色粘着板を設置し、成虫の発生状況を把握しながら適期防除を行う。
- (5) 薬剤散布は幼虫が寄生している葉裏に薬液が十分かかるように行う。
- (6) 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連続散布は避ける。

【その他の病害虫の発生予報】

作物名	病害虫名	発生時期	発生量	特記事項
果樹全般	ハダニ類	—	並	現在までの発生量は平年並。
リンゴ	斑点落葉病	—	並	現在までの発生量は平年並。 高温多湿条件で発生しやすく、連続した雨などの短期間の気象条件で急増することがあるので注意する。
	炭疽病	—	並	現在までの発生量は平年並。 高温多湿条件で発生しやすく、特に果実の濡れ時間が長いと感染しやすいので注意する。
	スモモヒメシンクイ	—	並	フェロモントラップによる誘殺数は平年並。
	キンモンホソガ	—	並	フェロモントラップ調査による誘殺数はやや多いが、現在までの発生量は平年並。
	ハマキムシ類	—	並	現在までの発生量は平年並。
野菜類 花き類	アブラムシ類	—	並	現在までの発生量は平年並。
	ハスモンヨトウ	—	並	現在までの発生量は平年並。 老齢幼虫になると薬剤の効果が低下するため、早期防除を徹底する
キュウリ	べと病	—	並	現在までの発生量は平年並。 肥料切れや草勢低下で発生が助長されるため適正な肥培管理を行う。また、多湿条件で増加するため適切な湿度管理を行う。
	うどんこ病	—	並	現在までの発生量は平年並。 多発してからの薬剤散布では防除効果が劣るので、発生を認めたら早めに防除する。
	褐斑病	—	並	現在までの発生量は一部が多いが平年並。 高温多湿条件下で発生が急激に増加するため、適切な湿度管理を行う。
	アザミウマ類	—	並	現在までの発生量は平年並。 ミナミキイロアザミウマはキュウリ黄化えそ病の原因となるため、発生に注意する。
ネギ	軟腐病	—	並	現在までの発生量はやや多い。 高温多湿条件で発生が助長されるため注意し、予防に努める。
	さび病	—	並	現在までの発生量は平年並。 秋が比較的低温で降雨が多いと多発する恐れがある。肥料切れにより発生が助長されるため、適正な肥培管理を行う。
	ネギアザミウマ	—	並	現在までの発生量は平年並。 秋の乾燥条件で発生が多くなるので注意する。

【今月の気象情報】

関東甲信地方 1 か月予報 (10月10日から11月9日までの天候見通し)

令和8年10月8日
気象庁 発表

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>

要素	地域	低い(少ない)	平年並	高い(多い)
気温	関東甲信地方	10	20	70
降水量	関東甲信地方	40	30	30
日照時間	関東甲信地方	20	40	40

<概要>

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

向こう1か月の平均気温は高い確率70%、降水量は少ない確率40%、日照時間は平年並または多い確率ともに40%です。

<参考> 前橋地方気象台観測平年値(10月)

	平均気温(℃)	降水量(mm)	日照時間(時間)
1半旬	19.5	26.9	22.0
2半旬	18.7	27.7	22.9
3半旬	17.7	24.7	24.6
4半旬	16.6	21.8	25.5
5半旬	15.6	19.9	26.8
6半旬	14.5	17.0	34.7

農薬の登録内容は随時変更されておりますので、防除薬剤については指導機関にご相談下さい。
また、以下のホームページでも確認できますのでご利用下さい。

◆ 農林水産省 農薬コーナー (農薬に関する様々な情報)

<http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html>

◆ 農薬登録情報提供システム (最新の農薬登録状況の検索や登録・失効農薬情報等)

<https://pesticide.maff.go.jp>

◆ 群馬県 農作物病害虫・雑草防除指針

<https://www.pref.gunma.jp/06/f0900064.html>

◆ 群馬県農業技術センター 病害虫発生予察情報一覧

<https://www.pref.gunma.jp/07/p14210015.html>

◆ ぐんま病害虫ライブラリー

<https://sites.google.com/view/g-byougai>



病害虫発生予察情報
一覧はこちら！