令和８年度コンニャク作況ほ最終成績（収穫期）

令和８年１１月６日
群馬県農政部蚕糸特産課

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

５～10 月の平均気温は 22.9℃（平年差＋0.7℃）で平年より高く、降水量は 1168.5 ㎜（平年比 118%）で平年より多く、日照時間は 793.4 時間（平年比 84%）で平年より少なかった。

植付けた種芋は、球茎・生子ともに小さい～やや小さく、貯蔵量は少ない～やや少なく、栽植密度はそ植～ややそ植のほ場が多かった。

初期生育は、出芽・開葉のばらつきはあったものの順調であった。その後も、順調に推移し、地上部の生育及び前月までの球茎の肥大は、概ね良好であった。一方で、病害の発生は、生育期間を通じて降雨が多かった影響により多発した。

成熟期は、９月下旬以降、朝晩の気温が低くなったことで、県内全域で平年より７日～10 日程度早まった。

〔諸障害の発生〕

「葉枯病」は、９月以降に発生が増加し、平年より多い。
「腐敗病」は、生育初期から発生が認められ、降雨の影響により、平年よりやや多い。
「根腐病」は、一部被害の大きいほ場もあり、平年並～やや多い。
「白絹病」の発生は、昨年度発生したほ場を中心に発病し、平年並～やや多い。

〔球茎の肥大〕

球茎（新芋）の肥大は、１年生において「あかぎおおだま」が良好であった一方、「みやままさり」はやや不良であった。

品種・年生別の作況指数は「あかぎおおだま」１年生で１１７、「あかぎおおだま」２年生で１０２、「みやままさり」１年生で９５、「みやままさり」２年生で９９であった。

種芋の球茎･生子は各品種ともに､腐敗病等の罹病芋が平年よりやや多いことから、貯蔵中の腐敗に注意するとともに選別を徹底し、種芋確保に努める必要がある。

以上を総合した作況指数の平年比加重平均は１０１で、前月から５ポイント減少した。

《 参考 》

作況指数の月別推移（平年比）

品　種	８月２日	９月２日	１０月２日	収穫期
あかぎおおだま　１年生	１０６	１１４	９９	１１７
２年生	１１５	１２５	１１９	１０２
みやままさり　１年生	１３８	１１９	１０５	９５
２年生	１１７	１１０	９９	９９
県作況指数	１１９	１１７	１０６	１０１

作況指数一覧表

No.	ほ場名	品種名	年生別	収穫期 A 種芋重量 (g)	収穫期 B 新芋重量 (g)	収穫期 B/A 肥大倍率 (倍)	作況指数 前年比	作況指数 平年比
1	渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	72.2	4.81	86	69
			2	100.0	610.2	6.10	181	98
2	高山	あかぎおおだま	1	15.0	109.7	7.3	130	133
			2	100.0	569.9	5.7	155	-
3	東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	167.1	11.14	176	146
			2	100.0	833.3	8.33	122	110
4	川場	あかぎおおだま	1	15.0	141.3	9.42	96	121
			2	100.0	698.8	6.99	103	100
5	渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	110.9	7.39	88	82
			2	100.0	545.7	5.46	112	81
6	渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	159.3	10.62	-	95
			2	100.0	795.0	7.95	117	98
7	安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	106.5	7.10	106	77
			2	100.0	600.6	6.01	167	102
8	安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	147.9	9.86	131	85
			2	100.0	868.5	8.69	159	102
9	富岡(妙義中里)	みやままさり	1	15.0	132.5	8.83	109	85
			2	100.0	787.0	7.87	133	96
10	富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	114.7	7.65	206	105
			2	100.0	630.9	6.31	186	100
11	昭和(橡久保)	みやままさり	1	15.0	166.2	11.08	219	119
			2	100.0	778.4	7.78	181	120
12	昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	164.3	10.95	107	117
			2	100.0	656.5	6.57	116	94
	平 均	あかぎおおだま	1	15.0	122.6	8.17	119	117
			2	100.0	678.1	6.78	135	102
		みやままさり	1	15.0	137.8	9.19	138	95
			2	100.0	707.8	7.08	146	99
							県作況指数	101


・県作況指数は、各品種・年生別平年比の加重平均により算出した。


・作況指数の平年値は過去10年間の作況指数による平均値を平年値とした。


・肥大倍率とは、植え付け種芋重量に対する収穫した新芋(球茎)重量の割合である。

・№6渋川(中郷)みやままさり1年生は、前年度著しい出芽不良が生じたことから平年比のみ掲載する。

・№2高山あかぎおおだま2年生は、令和6年度腐敗病によりデータ未採取により、平年比の算出ができないため、前年比のみ掲載する。


(℃)
半旬別平均気温(前橋)
2026
平年
35
30
25
20
15
10
1～5
6～10
11～15
16～20
21～25
26～31
26～30
5月
6月
7月
8月
9月
10月


(mm)
半旬別降水量(前橋)
2026
平年
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1～5
6～10
11～15
16～20
21～25
26～31
26～30
5月
6月
7月
8月
9月
10月


(h)
半旬別日照時間(前橋)
2026
平年
70
60
50
40
30
20
10
0
1～5
6～10
11～15
16～20
21～25
26～31
26～30
5月
6月
7月
8月
9月
10月