

令和5年度 病害虫情報 第1号

中山間地において、アブラムシ類の発生に注意してください。

有翅アブラムシ類のトラップ調査結果




図1 沼田市井土上町 黄色粘着トラップ

1 現在までのトラップにおける誘殺状況

(1) 沼田市井土上町に設置した黄色粘着トラップへの有翅アブラムシ類の飛来数は、5月下旬から急増し、平年（8カ年平均）の飛来数を大きく上回っています（図1）。このため中山間地のアブラムシ類の発生は平年より多いと考えられ、注意が必要です。

2 予想される被害と防除対策

- (1) 各作物（野菜、果樹、花き）で有翅アブラムシ類の吸汁による被害や、媒介する各種のウイルス病の発生が心配されます。ほ場をよく見回り、早期発見によりアブラムシ類の防除に努めてください。
- (2) 特に現在は種・定植をしている野菜・花き類で大きな影響が出る可能性があります。は種・定植時に殺虫剤を施用する等、初期防除に努めてください。
- (3) ほ場や育苗ハウス周辺の雑草はアブラムシ類の発生源となりやすいので、除草を行ってください。

※ 有翅アブラムシ類の最新のトラップ調査結果はこちら

→ <https://www.pref.gunma.jp/page/20720.html>



お問い合わせ先：群馬県農業技術センター環境部発生予察係 Tel:(0270)62-1059

☆ 農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている使用方法、注意事項等を確認して適正に使用してください。